



DENTÁLNÍ KLINIKA JAN STUHLÍK

DENTÁLNÍ KLINIKA JAN STUHLÍK

D32 s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8, 18600,

IČ 24151831

tel: 604442442, 273130160

Poučení pro budoucího uživatele částečné snímatelné náhrady

Částečná snímatelná náhrada slouží k ošetření částečně ozubené čelisti. Umožňuje částečné obnovení žvýkací funkce, výslovnosti a estetiky. V žádném případě však nedokáže nahradit v plném rozsahu funkci přirozeného chrupu nebo fixní protetické náhrady (korunek nebo můstku). Pro zajištění maximální stability při žvýkání a mluvení musí částečná snímatelná náhrada (dále jen náhrada) splňovat určité konstrukční zásady, které významným způsobem ovlivňují její užívání.

Následující text upozorňuje na jednotlivé charakteristiky náhrad, které mohou být zpočátku jejich užívání (a u někoho i dlouhodobě) vnímány negativně.

Od náhrady očekáváme:

- 1) dostatečnou stabilitu při mluvení a při jídle
- 2) obnovení a udržení správné výšky skusu a vzájemné pozice obou čelistí (faktor ovlivňující celkový vzhled a výraz tváře)
- 3) náhradu nejen chybějících zubů, ale také zredukovaného kostního podkladu a dásní (souvisí s předchozím bodem)

Ad 1) Stabilita při mluvení a žvýkání

Horní i dolní náhrada drží díky podtlaku a jednoduchým retenčním prvkům, které se vytváří jejím přisátím k podkladu. Čím větší je plocha náhrady, která se k podkladu může přisát, tím lépe náhrada drží. Proto je nezbytné u horní náhrady překrýt patro a okraje náhrady rozvést pod rty. Nevyhnutelné překrytí patra může negativně ovlivnit vnímání chuťových podnětů a vést k dávivým pocitům. Rozvedení okrajů náhrady mírně vyklenuje obrys rtů.

Dobře zhotovená horní náhrada by měla držet spolehlivě při mluvení (u dolní náhrady vzhledem k pohybu jazyka tohoto nelze vždy dosáhnout), při žvýkání sousta je potřeba se vyvarovat výrazným pohybům dolní čelisti do strany a rozhodně není možné sousta ukusovat předními zuby, což vede k uvolnění náhrady. Potravu je třeba krájet na drobné kousky nebo si ji rozmixovat.

Stabilita náhrady se může časem zhoršovat (náhrada je volnější), jelikož tvar dásně se časem mění a náhradu je třeba pravidelně v ordinaci vypodkládat (tzv. rebazovat) a navrátit ji její původní stabilitu.

Při jídle nelze zabránit ulpívání rozkousané potravy pod náhradou a je nutno ji po jídle vyčistit. Každodenní důkladné vyčištění náhrady přispívá nejen k dlouhodobému uchování dobrého vzhledu náhrady, ale také k prevenci vzniku mikrobiálních povlaků na povrchu náhrady, které mohou vést k zánětlivým změnám přiléhající dásně a sliznice úst.

Ad 2, 3) Kostní podklad částečně ozubené čelisti může být výrazně redukován oproti normě. Aby došlo k obnovení původní výšky skusu (a obličeji se navrátil výraz bez propadlých koutků a vysunutě brady) je někdy nutné použít silnější vrstvu materiálu (růžové pryskyřice), který nahrazuje chybějící dásně. To může vést na některých místech úst k pocitu přebytku materiálu a k problémům s výslovností, které by však časem měly vymizet.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem informován^a/^y o problematice částečných snímatelných náhrad a možných problémech souvisejících s jejich užíváním. V případě, že k návyku na celkovou snímatelnou náhradu nedojde a její užívání nebude možné, mohou tento problém ve většině případů vyřešit dentální implantáty.

V Praze, dne

Klient

Lékař