



DENTÁLNÍ KLINIKA JAN STUHLÍK

# DENTÁLNÍ KLINIKA JAN STUHLÍK

D32 s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8, 18600,

IČ 24151831

tel: 604442442, 273130160

## POUČENÍ PO SINUS-LIFTU

- běžné komplikace zákroku
  - v několika dnech po zákroku lze očekávat vznik **otoku** tváře, **hematomu** („modřiny“) na kůži, **bolesti** rány a blízkého okolí, výjimečně zvýšenou teplotu v období 24h po zákroku (do 38°C)
  - **infekce** rány je vzácnou komplikací, kterou je třeba řešit užíváním antibiotik, event. dalším lékařským zákrokem
  - protože zákrok probíhá uvnitř čelistní a v blízkosti nosní dutiny, může dojít ke **krvácení z nosu** v den implantace nebo ve dnech následujících; krvácení nevyžaduje většinou žádnou léčbu a spontánně ustane (nechat krev volně odtékat, přiložit kapesník namočený ve studené vodě na kořen nosu); v případě neustávajícího krvácení je třeba neodkladně ošetření lékařem
- vzácné komplikace zákroku
  - při otevření čelistní dutiny existuje riziko **protržení tenké sliznice**, která tvoří výstelku čelistní dutiny. Tuto sliznici je optimální ponechat nepoškozenou, aby tak ohraničovala prostor pro vkládanou kostní drť. Pokud dojde k malému natrhnutí, lze takový otvor překrýt. Při větším poškození membrány však není možné pokračovat ve výkonu, jelikož šance na zhojení kosti a úspěch sinus liftu je malá.
- velmi vzácné komplikace -
  - k **odhojení implantátu** dochází při implantaci do nekvalitní kosti nebo jinak změněného terénu, předčasněmu přílišnému zatížení implantátu nebo zcela teoreticky při alergii na titan.

### Pooperační péče:

- okolí rány zevně přerušovaně **chladit** v den zákroku, event. i následující den. Cílem je zmírnit rozvoj otoku a bolesti.
- ústní hygiena je doplněna o **výplachy** ústní vodou s desinfekční složkou (chlorhexidin) 3krát denně po dobu jedné minuty. V místě rány je hygiena zubním kartáčkem prováděna jen opatrně, v prvních čtyřech dnech vůbec.
- bolest** je možné tlumit léky typu Ibalgin, Aulin apod.
- kontrola u lékaře druhý a sedmý den po zákroku, při druhé kontrole budou odstraněny stehy
- implantát ani sliznice nad ním nesmí být v období vhojování (3 měsíce) zatěžovány např. kousáním tuhé stravy