



DENTÁLNÍ KLINIKA JAN STUHLÍK

DENTÁLNÍ KLINIKA JAN STUHLÍK

D32 s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8, 18600,

IČ 24151831

tel: 604442442, 273130160

Informace pro pacienta

Péče o hybridní snímatelné náhrady

Pilířové zuby (kořeny s kuličkovými zásuvnými spoji)

- 1) **čistit** malým (jednosvazkovým) kartáčkem okolo pilířových zubů směrem k dásni – **dvakrát denně** (po snídani a večer před spaním)
- 2) používat zubní pastu s fluoridy, pravidelně používat ústní vodu s fluoridy (např. Meridol)

(PROČ? Pravidelným odstraňováním bakteriálních povlaků z povrchu pilířových zubů se zabrání riziku vzniku zubního kazu a případné destrukci pilířových zubů. Fluoridy obsažené v zubní pastě jsou vhodným doplňkem v prevenci vzniku zubního kazu na kořenech pilířových zubů.)

Hybridní snímatelná náhrada

- 1) náhradu vyčistit pokud možno po každém jídle pod tekoucí vodou s kartáčkem
- 2) náhradu si na noc **VYJÍMEJTE!**

(PROČ? Slina, která hraje klíčovou roli v prevenci vzniku zubního kazu, se pod náhradu dostává pouze v omezeném, málo účinném množství. Žvýkácké tlaky se přenáší převážně přes dásně a/nebo patro, zatěžovaná sliznice si přes noc odpočine a prokrví se. Během spánku s náhradou v ústech může dojít k nevědomým nepřírozeným žvýkáckým pohybům, které mohou přetěžovat pilířové zuby.)

Pravidelné kontroly

(za účelem rebazování neboli podkládání vnitřního povrchu náhrady novým materiálem a případného odstranění zubního kamene)

1. **kontrola** – 3 měsíce po odevzdání náhrady
2. **kontrola** – 6 měsíců po odevzdání náhrady

Další návštěva alespoň jednou za 6 měsíců

(PROČ? Podkládáním vnitřního povrchu se náhrada přizpůsobuje měnícímu se povrchu dásní a tím se zajišťuje dlouhodobá stabilita náhrady)

Klient

lékař